



Masuri aplicabile pentru prevenirea introducerii pestei porcine africane pe teritoriul județului Olt

Pesta porcină africană este o boală care afectează numai porcinele, produce pagube economice foarte mari prin procentul ridicat de morbiditate și mortalitate în rândul efectivelor de porcine.

Având în vedere contextul epidemiologic actual, este necesar ca toți crescătorii de animale să aplique și să respecte anumite masuri de profilaxie.

În aceste condiții, pentru protejarea proprietelor animale se recomandă respectarea următoarelor măsuri de către crescătorii de animale:

- Sunt interzise circulația și transportul porcilor pe drumurile publice;
- Mijloacele de transport utilizate la transportul porcilor trebuie să fie curățate și dezinfecțiate înainte de ieșirea din zona de supraveghere,
- Niciun animal domestic, indiferent de specie (porcine, bovine, ovine, caprine, cabaline) nu intră sauiese din zona de supraveghere;
- Toate cazurile de îmbolnăvire sau moarte apărute la porcii din gospodării se anunță cât mai repede posibil medicului veterinar concesionar sau DSVSA OLT;
- Toate persoanele, inclusiv cele străine de gospodărie, care intră sau ies din gospodărie trebuie să respecte măsuri de igienă care să reducă riscul de transmitere a bolii;
- Să se evite intrarea în adăposturile în care se cresc porcii cu încălțăminte și hainele purtate pe stradă;
- Pentru dezinfecția la intrarea în adăpost este necesară amplasarea unei tavițe cu paie îmbibate cu o soluție slabă de sodă caustică;
- Să se evite contactul cu proprietari de animale străini care dețin porci domestici și să nu se permită intrarea în adăpostul în care se cresc porci;
- Porcii să fie crescuți doar în spații îngrădite, fără posibilitatea de a veni în contact cu porci străini de curtea proprie sau cu porci mistreti;
- Toți porcii să fie identificați și înregistrați în Baza Națională de Date;
- Să nu hrănească animalele cu resturi alimentare/lături/spălătura provenite de la carne de porc gătită în familie; dacă există vânători în familie care aduc carne de mistreț, sub nicio formă să nu administreze porcilor apa provenită de la spălarea cărnii sau resturi de carne;
- Este interzisă scoaterea scroafelor sau vierilor din exploatație în scopul montei cu animale din altă exploatație;
- Nu se folosește în hrana porcilor iarbă culeasă de pe câmp, pentru ca ea ar fi putut veni în contact cu porci mistreti bolnavi;

Semnele clinice care pot fi observate de crescătorii de porcine, sunt:

- Febra foarte mare care se menține 3-4 zile;
- Abatere, lipsa poftei de mancare, tuse, scurgeri și mucozități, conjunctivită purulentă și hemoragică;
- Consum excesiv de apă, vomitări, constipație urmată de diaree (uneori hemoragică);
- Pielea urechilor devine cianotică, uneori pot apărea hematoame;
- La nivelul părții inferioare a abdomenului, extremităților membrelor și cozii pe fondul cianotic apar pete hemoragice;
- Scroafele gestante avortează.

Aceste semne nu sunt neapărat caracteristice, ele putind fi observate și în alte boli ale porcilor, dar sunt de natură să determine crescătorul de porci să anunțe imediat medicul veterinar de libera practica imputernicit(din localitate) sau Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Olt la numarul de telefon 0372753837/0372753838.

Masuri aplicabile pentru prevenirea introducerii influentei aviare si pseudopestei aviare pe teritoriul judetului Olt

- Prevenirea oricarui contact direct si indirect intre pasarile salbatice vii, in special cele de apa si pasarile domestice si alte pasari, in special ratele si gastele;
- Astfel, se interzice accesul tuturor pasarilor domestice si pasari salbatice captive la luciurile de apa, lacuri, balti si orice alta amenajare hidrologica artificiala sau naturala;
- Separarea in cadrul gospodariei, in masura posibilitatilor a ratelor si gastelor de alte pasari domestice;
- Evitarea prin toate mijloacele a cresterii pasarilor domestice in aer liber, acestea trebuie tinute inchise obligatoriu in spatii de cazare special amenajate, hranierea si adaparea pasarilor se va realiza intr-o zona acoperita la care nu pot avea acces pasarile salbatice;
- Evitarea adaparii pasarilor domestice cu apa din rezervoarele de apa de suprafata accesibile pasarilor salbatice;
- Evitarea intrarii mai multor persoane, in zona de exploatare a pasarilor domestice, miscarile limitandu-se la o singura persoana (proprietarul exploatatiei);
- Prevenirea contactului cu alte specii de mamifere, inclusiv rozatoare si alte animale de companie;
- Aplicarea masurilor suplimentare cu scopul evitarii introducerii/diseminarii unei eventuale infectii, prin folosirea unei incaltaminte diferita in spatiul de exploatare a pasarilor domestice sau a unui amplasament special amenajat pentru dezinfectia incaltamintei;
- Acordarea unei atentii sporite asupra riscurilor introducerii si diseminarii bolii de catre vanatori, care pot transmite virusul de la salbatic la domestic prin pasari vanate si prelucrate in exploataatiile non profesionale (individuale), sau prin echipamentele (ustensilele) folosite la vanatoare, cat si cele comerciale care nu detin masuri stricte de biosecuritate, inclusiv exploataati de tip A;
- Notificarea urgenta a medicului veterinar de libera practica si DSVSA Olt asupra morbiditatii sau mortalitatii crescute observate in efectivele de pasari, in vederea recoltarii de probe si expedierii acestora la laborator, in scop de diagnostic.

Va informam ca miscarea animalelor si pasarilor intre judete, se face numai cu aviz interjudeLEAN , prin notificarea DSVSA cu minim 24 ore inainte de efectuarea transporturilor, atat din exploataatiile comerciale de tip A cat si din exploataatiile nonprofesionale.

Se mentin in continuare masurile privind interzicerea comercializarii animalelor si pasarilor vii in targuri.

Elaborat	Dr. Anghel Florentina	B.C.O.S.B.A.	27.02.2019	
----------	-----------------------	--------------	------------	---